

# Уважаемые граждане!

Если Вы услышали сигнал сирены или получили информацию по радио или телевидению о выбросе в атмосферу хлора или об опасности химического заражения, **НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ!**

<b>ЕСЛИ СИГНАЛ ЗАСТАЛ ВАС ДОМА</b>	<b>ЕСЛИ СИГНАЛ ЗАСТАЛ ВАС НА УЛИЦЕ</b>
<p>Не спешите покинуть жилое помещение.</p> <p>Прослушайте подробную информацию о возникшей чрезвычайной ситуации по радио или телевидению</p> <p>Если эвакуация не объявлена, примите меры по герметизации помещения.</p> <p>Закройте окна, фрамуга, форточки. Заклейте щели в оконных и дверных проемах подручными средствами (скотчем, лейкопластырем, бумагой и т.д.)</p> <p>Используйте ткань, смоченную водой, полиэтиленовую пленку или клеенку для прикрытия дверей, вентиляционных отверстий и т.д.</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания можно приготовить из подручных средств: используйте ватномарлевую повязку (полотенце, кусок ткани и др.), смочите их в 2%-м растворе питьевой соды. Если у Вас не оказалось соды - обильно смочите кусок ткани водой.</p>	<p>Остановитесь, сориентируйтесь, где находится источник опасности.</p> <p>Начните ускоренное движение в сторону, перпендикулярно направлению ветра.</p> <p>Если на пути движения встретятся препятствия, которые мешают быстро выйти из опасной зоны, укройтесь в ближайшем здании.</p> <p>Помните, пары хлора в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому старайтесь подняться на самый верхний этаж.</p>

При поступлении информации об эвакуации не опаздывайте! Покидая квартиру, не забудьте взять с собой документы и принять меры предосторожности (выключить электричество, газ, и т.д.)

**ПОМНИТЕ! Аварийно-спасательные службы города принимают все необходимые меры по локализации и ликвидации источника заражения**

**Справочно:** У паров хлора - специфический резкий запах (запах хлорной извести). Признаками поражения хлором являются: резь в глазах, обильное слезотечение, потеря зрения, ухудшение дыхания, приступообразный кашель.

**Оказание помощи:** свежий воздух, покой, тепло; обильное промывание глаз и кожи водой или мыльным раствором не менее 15 минут; немедленная эвакуация в лечебное учреждение